

Valutazione preclinica dei sintomi internalizzanti: confronto tra CABI e CBCL

Preclinical assessment of internalizing symptoms: comparison between CABI and CBCL

C. Cianchetti¹, M. Pasculli², F. Craig³, A. Fratta⁴, N. Faedda⁵, M. Marino⁶, A. Peschechera³, C. Zandrini⁷,
A. Zuddas², M.G. Ledda⁴, L. Margari³

¹ Già Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari; ² Neuropsichiatria Infantile, Dip. Scienze Biomediche, Università di Cagliari; ³ Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Bari; ⁴ Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza, Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", Cagliari; ⁵ Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Università, La Sapienza, Roma; ⁶ Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Università Federico II, Napoli; ⁷ Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Università di Pavia

Riassunto

Obiettivo. Valutazione della capacità di individuare la presenza di disturbi internalizzanti da parte di due strumenti compilati dai genitori: il nuovo strumento CABI a confronto con il noto CBCL.

Materiali e metodo. Lo studio è stato condotto su 219 pazienti di età 8-17 anni affetti da varie patologie psichiatriche includenti o meno disturbi depressivi e disturbi d'ansia. I risultati ottenuti con i due strumenti per le subscale "depressione" e "ansia" sono stati confrontati con le diagnosi cliniche finali di depressione e ansia. È stato valutato quanto le risposte date dai genitori a ciascun strumento prima delle indagini cliniche corrispondessero alle diagnosi finali.

Risultati. Per quanto riguarda i sintomi depressivi il CABI ha mostrato una significativamente maggiore sensibilità diagnostica rispetto al CBCL, ma una minore specificità. Non vi è stata differenza per i sintomi d'ansia. L'accuratezza diagnostica dei due strumenti è risultata identica.

Conclusioni. Lo strumento CABI, molto più breve (75 items) e gratuito, comparato con il noto CBCL, mostra avere la stessa accuratezza diagnostica per i sintomi di depressione e di ansia, con una maggiore sensibilità per i sintomi depressivi.

Parole chiave: Depressione, Ansia, Internalizzanti, CABI, Valutazione, Strumenti

Summary

Objective. The evaluation of the ability to identify the presence of internalizing disorders by two instruments compiled by the parents: the new CABI tool compared to the known CBCL.

Material and methods. The study was conducted on 219 patients aged 8-17 years affected by various psychiatric disorders including or not depressive disorders and anxiety disorders. The results obtained with the two instruments for the "depression" and "anxiety" subscales were compared with the final clinical diagnoses of depression and anxiety. It was assessed how much the answers given by the parents to each instrument before the clinical investigations corresponded to the final diagnoses.

Results. Regarding depressive symptoms, CABI showed a significantly higher diagnostic sensitivity than CBCL, but a lower specificity. There was no difference for anxiety symptoms. The diagnostic accuracy of the two instruments was identical.

Conclusion. The CABI instrument, much shorter (75 items) and free, compared with the known CBCL, shows the same diagnostic accuracy for symptoms of depression and anxiety, with a greater sensitivity for depressive symptoms

Key words: Depression, Anxiety, Internalizing, CBCL, Assessment, Tools

CORRISPONDENZA

Carlo Cianchetti, Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari - E-mail: cianchet@unica.it